

Dati due  $K$ -spazi vettoriali  $V$  e  $W$ , con basi rispettive  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ,  $B' = \{w_1, \dots, w_m\}$ , e data' un'applicazione lineare  $f: V \rightarrow W$ , nell'ultima lezione abbiamo definito la **matrice associata ad  $f$  rispetto alle basi  $B$  e  $B'$** :

$$M_{B'B}(f) = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(K)$$

dove  $\forall j=1, \dots, n$ ,  $f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$ .

(avendo la colonna  $j$ -esima di  $M_{B'B}(f)$  costituita dalle coordinate di  $f(v_j)$  rispetto alla base  $B'$ ).

### Esempio

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x,y,z) &\mapsto (x+2y+3z, -x+5y-7z) \end{aligned}$$

Consideriamo le basi:

- $B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$  di  $\mathbb{R}^3$ ,
- $B' = \{(1,1), (1,-1)\}$  di  $\mathbb{R}^2$ .

Vogliamo scrivere la matrice  $M_{B'B}(f) \in M_{2,3}(\mathbb{R})$

Allora abbiamo:

$$f(1,0,0) = (1, -1) = 0 \cdot (1,1) + 1 \cdot (1, -1)$$

$$f(0,1,0) = (2, 5) = \frac{7}{2} \cdot (1,1) - \frac{3}{2} \cdot (1, -1)$$

$$f(0,0,1) = (3, -7) = -2 \cdot (1,1) + 5 \cdot (1, -1)$$

per determinare  $\frac{7}{2}$  e  $-\frac{3}{2}$   
abbiamo risolto il  
sistema che si ottiene da:

$$(2, 5) = a(1,1) + b(1, -1)$$



$$\begin{cases} a+b=2 \\ a-b=5 \end{cases}$$

Quindi otteniamo:

$$M_{B'B}(f) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{7}{2} & -2 \\ 1 & -\frac{3}{2} & 5 \end{pmatrix}$$

Vediamo ora che questa matrice  $M_{B'B}(f)$  ci permette di calcolare l'immagine di un vettore  $v \in V$  con un semplice prodotto di matrici.

## Calcolo dell' immagine di un vettore

Proposizione : Siano  $V$  e  $W$  due spazi vettoriali e  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ ,  $B' = \{w_1, \dots, w_m\}$  basi di  $V$  e  $W$  rispettivamente.

Sia  $f: V \rightarrow W$  un'applicazione lineare. Allora per ogni

$$v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \in V$$

si ha

$$f(v) = y_1 w_1 + \dots + y_m w_m \in W$$

dove

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = M_{B'B}(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

$(y_1, \dots, y_m)$  sono le coordinate di  $f(v)$  rispetto alla base  $B'$

$(x_1, \dots, x_n)$  sono le coordinate di  $v$  rispetto alla base  $B$ .

## Esempio

Torniamo all'esempio precedente dove avevamo calcolato

$$M_{B'B}(f) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{7}{2} & -2 \\ 1 & -\frac{3}{2} & 5 \end{pmatrix}.$$

Sia  $v = (1, -2, -1) \in \mathbb{R}^3$  ( $(1, -2, -1)$  sono proprio le coordinate rispetto alla base canonica  $B$ ).

Calcoliamo :

$$M_{B'B}(f) \cdot v = \begin{pmatrix} 0 & \frac{7}{2} & -2 \\ 1 & -\frac{3}{2} & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{queste sono le coordinate di } f(1, -2, -1) \text{ rispetto alla base } B' = \{(1, 1), (1, -1)\}$$

$$\Rightarrow f(1, -2, -1) = -5 \cdot (1, 1) - 1 \cdot (1, -1) = (-6, -4) \rightarrow \text{queste sono le coordinate di } f(1, -2, -1) \text{ rispetto alla base canonica di } (\mathbb{R}^2).$$

Usando l'espressione di  $f$  si verifica facilmente che  $f(1, -2, -1) = (-6, -4)$

## Composizione di applicazioni lineari

Vediamo ora che la composizione di applicazioni lineari corrisponde al prodotto delle matrici associate.

Consideriamo tre K-spazi vettoriali:

$$\begin{aligned} V \text{ con base } B_V &= \{v_1, \dots, v_n\} \\ W \text{ con base } B_W &= \{w_1, \dots, w_m\} \\ U \text{ con base } B_U &= \{u_1, \dots, u_p\}. \end{aligned}$$

Siano  $f: V \rightarrow W$  e  $g: W \rightarrow U$  due applicazioni lineari.

Poiché  $f(V)$  è contenuto nel dominio di  $g$ , possiamo considerare la composizione di  $f$  e  $g$ :

$$g \circ f: V \rightarrow U.$$

Vogliamo studiare la relazione tra la matrice  $M_{B_U B_V}(g \circ f)$  e le matrici  $M_{B_W B_V}(f)$  e  $M_{B_U B_W}(g)$ .

Sia  $v = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \in V$ . Allora, per la proposizione precedente abbiamo:

$$f(v) = y_1 w_1 + \dots + y_m w_m \in W, \text{ dove } \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = M_{B_W B_V}(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Inoltre

$$g(f(v)) = z_1 u_1 + \dots + z_p u_p, \text{ dove } \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_p \end{pmatrix} = M_{B_U B_W}(g) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

Quindi:

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_p \end{pmatrix} = M_{B_U B_W}(g) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = M_{B_U B_W}(g) M_{B_W B_V}(f) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Ne segue che:

$$M_{B_U B_V}(g \circ f) = M_{B_U B_W}(g) M_{B_W B_V}(f)$$

ossia la matrice  $M_{B_U B_V}(g \circ f)$  associata a  $g \circ f$  rispetto alle basi  $B_V$  e  $B_U$ . Si ottiene moltiplicando le matrici  $M_{B_U B_W}(g)$  e  $M_{B_W B_V}(f)$  associate rispettivamente a  $g$  e a  $f$ .

## La matrice del cambiamento di coordinate

Sia  $V$  un  $K$ -spazio vettoriale e siano  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  e  $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$  due basi di  $V$ .

Consideriamo l'applicazione identità  $\text{id}_V$

$$\text{id}_V: \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\quad \text{in } B \quad} & V \\ v & \longmapsto & v \end{array}$$

e immaginiamo  $\mathcal{C}$  lo spazio di partenza dotato della base  $B$  e  $\mathcal{C}'$  lo spazio di arrivo dotato della base  $B'$ .

La matrice  $M_{B'B}(\text{id}_V)$  è detta **MATRICE DEL CAMBIAMENTO DI COORDINATE** dalla base  $B$  alla base  $B'$ , in quanto conoscendo le coordinate di un vettore  $v$ , rispetto alle basi  $B$ , permette di calcolare le coordinate di  $v$  rispetto alle basi  $B'$ .

In fatti, sia  $v \in V$ . Allora

$$\begin{aligned} v &= x_1 v_1 + \dots + x_n v_n \\ &\stackrel{''}{=} id(v) = y_1 v'_1 + \dots + y_n v'_n. \end{aligned}$$

e quindi

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = M_{B'B}(\text{id}_V) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Vediamo ora che le matrici  $M_{B'B}(\text{id}_V)$  e  $M_{B'B'}(\text{id}_V)$  sono inverse l'una dell'altra:

$$M_{B'B'}(\text{id}_V) \cdot M_{B'B}(\text{id}_V) = M_{B'B}(\text{id}_V \circ \text{id}_V) = M_{B'B}(\text{id}_V) = I_n.$$

$$\begin{aligned} \text{id}_V(v_1) &= 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \dots + 0 \cdot v_n \\ \text{id}_V(v_n) &= 0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_{n-1} + v_n \end{aligned}$$

Quindi:

$$M_{B'B'}(\text{id}_V) = (M_{B'B}(\text{id}_V))^{-1}$$

## Esempio

Sia  $V = \mathbb{R}^3$ . Consideriamo le basi seguenti di  $\mathbb{R}^3$ :

$$B = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\} \quad (\text{base canonica})$$

$B' = \{(1,-1,0), (0,-2,-1), (1,1,2)\}$  (ci si puo' convincere che tali vettori formano una base mostrando che

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$$

Calcoliamo  $M_{BB'}(\text{id}_V)$ : poiché  $\text{id}(v) = v \quad \forall v \in \mathbb{R}^3$ , basterà decomporre ogni vettore di  $B'$  sulla base canonica  $B$ :

$$\text{id}_V(1,-1,0) = (1,-1,0) = 1 \cdot (1,0,0) + (-1) \cdot (0,1,0) + 0 \cdot (0,0,1),$$

$$\text{id}_V(0,-2,-1) = (0,-2,-1) = 0 \cdot (1,0,0) + (-2) \cdot (0,1,0) + (-1) \cdot (0,0,1),$$

$$\text{id}_V(1,1,2) = (1,1,2) = 1 \cdot (1,0,0) + 1 \cdot (0,1,0) + 2 \cdot (0,0,1).$$

Quindi:

$$M_{BB'}(\text{id}_V) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

ovvero se  $B$  è la base canonica,  $M_{BB'}(\text{id}_V)$  è semplicemente la matrice le cui colonne sono i vettori di  $B'$ .

La matrice  $M_{B'B}(\text{id}_V)$  è invece più "difficile" da calcolare. Si può procedere in due modi distinti:

1) Calcolando l'inversa di  $M_{BB'}(\text{id}_V)$  con uno dei metodi visti durante il corso (algoritmo di Gauss-Jordan, matrice dei cofattori, etc.)

2) Decomponendo i vettori della base canonica sulla base  $B'$ :

$$\text{es: } (1,0,0) = ?? \cdot (1,-1,0) + ?? \cdot (0,-2,-1) + ?? \cdot (1,1,2).$$

$$(\text{risolvendo R}) \rightarrow \begin{matrix} \uparrow \\ \frac{3}{2} \\ \text{sistema} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \uparrow \\ -1 \\ -\frac{1}{2} \end{matrix}$$

$$\text{In ogni caso si trova } M_{B'B}(\text{id}_V) = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

e si può facilmente verificare che  $M_{BB'}(\text{id}_V) \cdot M_{B'B}(\text{id}_V) = I_3$ .

## ENDOMORFISMI DI SPAZI VETTORIALI

Ci concentriamo ora sul caso particolare degli endomorfismi.

Ricchiamiamo innanzitutto la definizione:

Def: Sia  $V$  uno spazio vettoriale. Un **ENDOMORFISMO** o un **OPERATORE LINEARE** di  $V$  è un'applicazione lineare

$$f: V \longrightarrow V.$$

L'insieme degli endomorfismi di  $V$  si denota  $\text{End}(V)$ .


Sia  $B = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base di  $V$  e sia  $f \in \text{End}(V)$ . Allora:

$$M_B(f) := M_{BB}(f) \in M_n(K).$$

Se  $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$  è un'altra base di  $V$  allora, per quanto visto precedentemente

$$M_{B'}(f) = M_{B'B}(\text{id}_V) \cdot M_B(f) \cdot M_{BB'}(\text{id}_V).$$

Un diagramma può aiutare a "visualizzare" questo prodotto di matrici.



Ora, applicando il teorema di Binet, otteniamo:

$$\begin{aligned} \det(M_{B'}(f)) &= \det(\underbrace{M_{B'B}(\text{id}_V)}_{\text{"}} \cdot \det(M_B(f)) \cdot \det(M_{BB'}(\text{id}_V)) = \\ &= \frac{1}{\det(M_{B'B}(\text{id}_V))} \cdot \det(M_B(f)) \cdot \det(M_{BB'}(\text{id}_V)) = \det(M_B(f)). \end{aligned}$$

$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

Cioè mostra che il determinante della matrice associata ad  $f$  non dipende dalla scelta della base. Pertanto possiamo parlare del **determinante** dell'operatore  $f$  e lo denotiamo  $\det(f)$ .

Tra tutte le basi di  $V$  siamo particolarmente interessati a quelle, se esistono, rispetto a cui la matrice associata a  $f: V \rightarrow V$  è diagonale.

Cerchiamo di capire il "vantaggio" di queste basi con un esempio, che interpreteremo anche da un punto di vista geometrico.

Sia  $V = \mathbb{R}^2$ , sia  $B = \{(1,1), (1,-1)\}$  una base di  $\mathbb{R}^2$  e sia  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  l'applicazione lineare tale che:

$$M_B(f) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{matrice diagonale}).$$

Poniamo  $v_1 := (1,1)$  e  $v_2 := (1,-1)$ . Determiniamo le immagini di  $v_1$  e  $v_2$ :


$$f(v_1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}_B = 2 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 = 2v_1 = (2,2)$$

$v_1$  ha coordinate  $(1,0)$  rispetto alle basi  $B$ . Infatti:  
 $v_1 = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2$ .

$$f(v_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}_B = 0 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2 = -v_2 = (-1,1)$$

Vediamo quindi che  $f(v_1)$  e  $f(v_2)$  sono multipli rispettivamente di  $v_1$  e  $v_2$ .

Da un punto di vista geometrico ciò significa che  $v_1$  e  $f(v_1)$  giacciono sulla stessa retta vettoriale. Stessa cosa per  $v_2$  e  $f(v_2)$ .




Mostriremo che questo è una proprietà che vale solo per i vettori in  $\langle v_1 \rangle$  e  $\langle v_2 \rangle$ .

Ad esempio:

$$f(v_1 + v_2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}_B = 2v_1 - v_2 = (1, 3)$$

$$f(2,0)$$

e  $(3,1)$  non è collineare a  $(2,0)$ .



Poiché  $f(v_1) = 2v_1$  e  $f(v_2) = -v_2$ :

- chiameremo  $v_1$  e  $v_2$  "autovettori";
- chiameremo  $2$  e  $-1$  gli "autovalori" relativi rispettivamente agli autovettori  $v_1$  e  $v_2$ .
- chiameremo le rette vettoriali  $\langle v_1 \rangle$  e  $\langle v_2 \rangle$  gli "autospazi" relativi rispettivamente agli autovalori  $2$  e  $-1$ .
- chiameremo  $\{v_1, v_2\}$  una "base diagonalizzante" per  $f$ .
- diremo che  $f$  è un operatore "diagonalizzabile".